

Tratamento

O tratamento para angioedema, uma condição caracterizada pelo inchaço súbito e temporário da pele e tecidos subcutâneos, varia dependendo da causa subjacente. Em casos leves, pode-se administrar anti-histamínicos para aliviar os sintomas. Se o angioedema for grave ou recorrente, os médicos podem prescrever medicamentos como corticosteroides, epinefrina ou inibidores de enzimas específicas (como inibidores da enzima conversora de angiotensina) para controlar as crises e prevenir recorrências. Em casos de angioedema hereditário, terapias específicas, como inibidores do sistema cininogênio ou reposição de C1 inibidor, podem ser necessárias. O tratamento é sempre personalizado, requerendo avaliação médica para determinar a abordagem mais adequada com base na causa e na gravidade do angioedema.

PELA SUA SAÚDE:

1. LEIA AS INFORMAÇÕES
DAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS.

2. SIGA AS INSTRUÇÕES
DO SEU MÉDICO
OU FARMACÊUTICO.



Horário de Assistência Farmacêutica:

Segunda à Sexta

das 07h00 às 17h00

**Para maiores Informações procure o
Farmacêutico.**



Comissão de Atenção Farmacêutica
Farmácia do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento
da Medicina
2025

Farmácia de Medicamentos Especializados
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

COMISSÃO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA

ANGIOEDEMA




Introdução

Angioedema é uma condição médica caracterizada por inchaço súbito e temporário da pele, tecidos subcutâneos e mucosas. Geralmente afeta áreas como lábios, olhos, mãos e pés, causando inchaço notável e, em alguns casos, desconforto ou dor. O angioedema pode ser causado por reações alérgicas, certos medicamentos, alimentos ou por razões genéticas. Em algumas situações, pode estar associado a condições subjacentes, como urticária crônica. A condição pode ser grave se afetar a garganta, dificultando a respiração e exigindo cuidados médicos urgentes. O tratamento depende da causa subjacente e pode incluir medicamentos antialérgicos e corticosteroides.



Causas

As causas do angioedema podem incluir reações alérgicas a alimentos, medicamentos ou picadas de insetos. Em alguns casos, é desencadeado por estresse, exercício ou exposição ao frio. O angioedema hereditário é uma forma genética rara causada por deficiência ou disfunção de uma proteína no sangue. Além disso, certas condições médicas, como urticária crônica, podem estar associadas ao angioedema. O diagnóstico preciso requer avaliação médica para determinar a causa subjacente, possibilitando um tratamento adequado e específico para cada situação.



Sintomas

Os sintomas do angioedema incluem inchaço súbito e temporário da pele, tecidos subcutâneos e mucosas, geralmente nas áreas dos lábios, olhos, mãos, pés, genitais ou garganta. O inchaço pode ser acompanhado de coceira ou desconforto e, em casos graves, pode dificultar a respiração se a garganta estiver envolvida, o que requer atenção médica urgente. O angioedema também pode ocorrer com urticária, que se manifesta como erupções cutâneas avermelhadas e coceira. Os sintomas variam em intensidade e duração, dependendo da causa subjacente. O diagnóstico e tratamento devem ser conduzidos por profissionais de saúde para evitar complicações.