

Tratamento

O tratamento da artrite idiopática juvenil (AIJ) é individualizado, visando controlar a inflamação, aliviar a dor e preservar a função articular. Geralmente, utiliza-se uma abordagem progressiva, começando com medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para sintomas leves a moderados. Para casos mais severos, são considerados medicamentos modificadores da doença, como metotrexato. Terapias biológicas podem ser uma opção em casos refratários. Além disso, a fisioterapia e a terapia ocupacional desempenham um papel importante para preservar a mobilidade e a funcionalidade. O manejo é realizado em colaboração com reumatologistas pediátricos, sendo crucial o monitoramento regular para ajustes terapêuticos conforme necessário.

PELA SUA SAÚDE:

1. LEIA AS INFORMAÇÕES
DAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS.

2. SIGA AS INSTRUÇÕES
DO SEU MÉDICO
OU FARMACÊUTICO.



Horário de Assistência Farmacêutica:

Segunda à Sexta

das 07h às 17h

**Para maiores Informações procure o
Farmacêutico.**



Comissão de Atenção Farmacêutica
Farmácia do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
2025

Farmácia de Medicamentos Especializados
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

COMISSÃO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA

ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL



Introdução

A artrite idiopática juvenil (AIJ) é uma condição reumática crônica caracterizada por inflamação persistente nas articulações em crianças com menos de 16 anos. Sua origem permanece desconhecida, e a doença se apresenta de forma variada, podendo afetar uma ou várias articulações. Os sintomas incluem dor, inchaço e rigidez articular. A AIJ é diagnosticada mediante critérios clínicos específicos, e o tratamento é direcionado para controlar a inflamação, aliviar sintomas e preservar a função articular, sendo adaptado à gravidade e características individuais de cada caso. O acompanhamento médico regular é essencial para uma gestão eficaz.

Causas

A causa da artrite idiopática juvenil (AIJ) permanece desconhecida. Trata-se de uma condição reumática crônica que se manifesta por inflamação articular persistente em crianças com menos de 16 anos. Fatores genéticos e imunológicos são considerados contribuintes, mas a etiologia exata permanece indefinida. O diagnóstico é clínico, baseado em critérios específicos, e o tratamento visa controlar a inflamação e preservar a função articular. A AIJ é uma doença heterogênea, com diferentes subtipos, apresentando variabilidade na sua expressão clínica.

Sintomas

Os sintomas da artrite idiopática juvenil (AIJ) incluem dor articular, inchaço, rigidez matinal, limitação de movimento e, por vezes, febre. Estes sintomas podem variar em intensidade e duração, sendo necessários para o diagnóstico da condição. A AIJ é uma doença reumática crônica que afeta crianças com menos de 16 anos, e sua apresentação clínica pode ser heterogênea, envolvendo diferentes articulações e sistemas. O diagnóstico e manejo adequados são fundamentais para mitigar o impacto da doença na qualidade de vida da criança.

