


Tratamento

De maneira geral, o tratamento dos hemangiomas infantis limita-se a acompanhar, com regularidade, a evolução do quadro, que costuma ser benigno, autolimitado e de regressão espontânea.

Quando se faz necessário intervir, entre as várias opções terapêuticas, o médico pode selecionar a que melhor atende às necessidades de cada criança.

TUMOR VASCULAR BENIGNO

saudebemestar.pt



HEMANGIOMA
SUPERFICIAL

HEMANGIOMA
PROFUNDO

HEMANGIOMA
COMPOSTO

PELA SUA SAÚDE:

1. LEIA AS INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS.
2. SIGA AS INSTRUÇÕES DO SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO.



Horário de Assistência Farmacêutica:

Segunda à Sexta

das 07h00 às 17h00

**Para maiores Informações procure o
Farmacêutico.**



Comissão de Atenção Farmacêutica
Farmácia do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina
2025

Farmácia de Medicamentos Especializados
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

COMISSÃO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA

Hemangioma Infantil




Introdução

Hemangioma é um tumor benigno comum na infância. Ele é formado pela proliferação excessiva e desordenada de minúsculos vasos sanguíneos que se acumulam na pele, ou em órgãos internos. A lesão vascular pode ser congênita, ou surgir nas primeiras semanas de vida da criança. Inicialmente, consiste num sinal plano, vermelho e brilhante (lembra a cor do morango e da framboesa), que se instala na camada superior da pele, no tecido subcutâneo, ou adquire uma tonalidade azulada, quando situada em regiões mais profundas.

Existem diferentes tipos de hemangiomas. Quanto à localização, eles podem ser classificados em superficiais, profundos ou mistos. Embora sejam mais frequentes na infância, podem surgir em qualquer idade, até mesmo na velhice.

Causas

Ainda não foi bem estabelecida a causa dos hemangiomas infantis. Pesquisas indicam que, provavelmente, se trata de um evento multifatorial, que inclui elementos hormonais, genéticos, mecânicos e ambientais, e envolve o mau funcionamento do sistema vascular do embrião nas primeiras semanas da gestação materna.



Sintomas

Os principais sintomas são as manchas vermelho vivo ou arroxeadas, de diferentes tamanhos e textura, que podem surgir na superfície da pele ou em órgãos internos, como o fígado, o trato gastrointestinal, a laringe, pâncreas, baço, bexiga, pulmões, e bolsas sinoviais, entre outros. O que mais chama a atenção e incomoda, porém, é o comprometimento estético que essas lesões conferem.

Em geral, os hemangiomas são assintomáticos, embora sensíveis ao toque. Situados em órgãos internos, não raro passam despercebidos. Quando afetam áreas da pele mais expostas ao atrito – aquelas em contato com a fralda, por exemplo – ou que recebem maior pressão, podem ocorrer sangramentos e a formação de feridas que doem e demoram a cicatrizar.