

Tratamento

Tratamento não medicamentoso: terapias cognitivas, físicas, psicológicas, educacionais e de estimulação cognitiva.

Tratamento medicamentoso:

São utilizados medicamentos antipsicóticos no tratamento da esquizofrenia e do transtorno esquizoafetivo. Tratamento disponível no CEAF:

- Olanzapina 5 mg e 10 mg – comprimido
- Quetiapina 25 mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg – comprimido
- Risperidona 1 mg, 2 mg e 3 mg – comprimido
- Ziprasidona 40 mg e 80 mg – cápsula
- Clozapina 25 mg e 100 mg – comprimido



PELA SUA SAÚDE:

1. LEIA AS INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS.



2. SIGA AS INSTRUÇÕES DO SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO.



Horário de Assistência Farmacêutica:

Segunda à Sexta

das 07h00 às 17h00

Para maiores Informações procure o Farmacêutico.



Comissão de Atenção Farmacêutica
Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
2025

Farmácia de Medicamentos Especializados
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

COMISSÃO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA

TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO



Introdução



A definição de transtorno esquizoafetivo ainda precisa de maior consenso, podendo ser uma variante da esquizofrenia, na qual os sintomas do humor são excepcionalmente proeminentes e comuns; uma forma grave de transtorno depressivo ou bipolar, na qual os sintomas psicóticos não cedem completamente entre os episódios de humor; ou duas doenças psiquiátricas relativamente comuns concomitantes, a esquizofrenia e um transtorno de humor (transtorno depressivo maior ou transtorno bipolar).

Causas

Ainda não há uma conclusão sobre a causa exata dessa doença, porém existem alguns fatores que deste transtorno.

São eles:

- Fatores genéticos;
- Parentes com esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou transtorno bipolar;
- Problemas durante a gestação ou parto;
- Traumas ou eventos estressantes;
- Uso de drogas psicoativas ou psicotrópicas.



Sintomas

Sintomas psicológicos:

- Alucinações;
- Paranóia;
- Psicose;
- Depressão;
- Ansiedade;
- Variação de humor;
- Delírios.

Cognição e comportamentos comuns:

- Pensamentos acelerados;
- Perda repentina de interesse nas atividades do dia a dia;
- Impulsividade;
- Isolamento social;
- Comportamento motor inapropriado;
- Falta de rendimento escolar ou no trabalho;
- Problemas com sono.