

Tratamento

Medicamentos chamados esteróides podem reduzir a inflamação no olho. Isso pode aliviar os sintomas e prevenir a perda de visão.

- **Colírio:** os colírios prescritos são o tratamento mais comum;
- **Comprimidos:** Pode-se prescrever esteróides em pílula (oral);
- **Injeções:** Em alguns casos, pode-se inserir o esteróide dentro ou ao redor do olho com uma pequena agulha;
- **Implantes:** Se outros tratamentos não funcionarem, pode-se sugerir uma cirurgia para colocar um pequeno dispositivo por meio de um implante em seu olho. Este fornece pequenas doses regulares do esteróide ao longo do tempo.



PELA SUA SAÚDE:

1. LEIA AS INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS.



2. SIGA AS INSTRUÇÕES DO SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO.



Horário de Assistência Farmacêutica:

Segunda à Sexta

das 07h00 às 17h00

Para maiores Informações procure o Farmacêutico.



Comissão de Atenção Farmacêutica
Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
2025

Farmácia de Medicamentos Especializados
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

COMISSÃO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA

UVEÍTES NÃO INFECCIOSAS



Introdução

A uveíte é uma inflamação dentro do olho, que pode ser infecciosa (vírus, protozoário, fungo ou bactéria) ou não infecciosa (autoimune).

Essa inflamação geralmente ocorre quando seu sistema imunológico está combatendo uma infecção ocular, ou quando o mesmo ataca o tecido saudável dos olhos. Ela pode causar problemas como dor, vermelhidão e perda de visão.



Causas

Como as causas são muitas, alguns testes laboratoriais podem ser necessários para complementar o diagnóstico, e identificar doenças sistêmicas que possuem manifestações oculares, como testes reumatológicos e sorologia para doenças infecciosas com manifestações sistêmicas.

Além disso, exames de imagem como a radiografia, pode ser utilizada para verificar uma artrite coexistente. O raio-X do tórax pode ser útil na sarcoidose e tuberculose. No caso de doenças sistêmicas a tomografia ou a ressonância magnética também podem ser aliadas para consolidar o diagnóstico.



Sintomas

Os primeiros sintomas de uveíte geralmente começam de repente. Os sintomas incluem:

- visão embaçada;
- *floaters* (pequenas manchas escuras ou linhas onduladas que flutuam em sua visão);
- dor nos olhos;
- olhos vermelhos;
- sensibilidade à luz.

Se você notar esses sintomas, consulte o seu oftalmologista imediatamente. A uveíte pode causar perda de visão se não tratada adequadamente.

